1/4/2025

CAMPOS ESCALARES Y VECTORIALES

* Gráfica de una función escalar

- Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

La gráfica de una función escalar es: $G_f = \{ (x_1, \dots, x_n, y) \in \mathbb{R}^{n+1} / (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \wedge y = f(x_1, \dots, x_n) \}$

→ Cuando grafico, aumenta una dimensión más = → Agrego una var → imagen de la función

* Conjunto de nivel

Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $k \in \mathbb{R}$, el conjunto nivel k de f se define como $N_k(f) = L_k(f)$

$$N_k = \{ x \in \mathbb{R}^n / x \in D \wedge f(x) = k \} \Rightarrow \{ x \in D / f(x) = k \}$$

• Ejemplo = Hallar conjunto nivel 0 de $f(x, y) = 4y - y^2 - yx^2 \rightarrow \text{Dom } (x, y) \in \mathbb{R}^2$

Entonces $\rightarrow N_0 = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / 4y - y^2 - yx^2 = 0 \}$
 $y \neq 0$

Se puede simplificar $\Rightarrow 4y - y^2 = yx^2 \Rightarrow x^2 = 4 - y \Rightarrow \boxed{y = 4 - x^2}$ una Parábola

Reescribimos $N_0 f = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = 4 - x^2 \}$
 $y \neq 0$

Gráfica de Conj. nivel
no es gráfica
del campo escalar

• Ejemplo 2 Hallar conj. nivel k $f(x, y) = y/x$

① $\Rightarrow \text{Dom} = \mathbb{R}^2 - \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / x = 0 \}$

② $\Rightarrow N_k(f) = \{ (x, y) \in D / \frac{y}{x} = k \} \Rightarrow \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = kx \wedge x \neq 0 \}$
↓
rectas

* Límite funciones varias variables

Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $n > 1$ y sea A un punto de acumulación (interior/frontera) de D Definición formal ↓

Decimos que $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = L$ si $\forall B(L, \varepsilon)$ existe $B^*(A, \delta)$ / si $x \in D \cap B^*(A, \delta) \rightarrow f(x) \in B(L, \varepsilon)$

Si $\boxed{m > 1} \rightarrow f(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x)) \rightarrow \lim_{x \rightarrow A} f(x) = L = (L_1, \dots, L_m)$, donde $\lim_{x \rightarrow A} f_i(x) = L_i$; $\forall i \in [1, m]$

Ejemplo $\circ \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} [x^2 y + \cos(x)(y-2)^2]$

$$= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} (x^2 y) + \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \cos(x) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} [(y-2)^2] = 0 + 1 = 1$$

$\circ \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{x^2 (y-1)}{x^2 + (y-1)^2} \Rightarrow \text{Indet } \frac{0}{0} \rightarrow$ No se puede simplificar con L'Hopital

para funciones de una sola variable

① PROBAR INEXISTENCIA DE LÍMITES POR CURVAS

Como el punto de tendencia es en $\mathbb{R}^2$ (en este caso) escajo hay infinitas formas de acercarme

pero elijo una familia de curvas (rectas, parábolas) que pasen por el punto

Este método sólo puede demostrar la inexistencia de un límite $\rightarrow$ No prueba la existencia de $\lim$

Ejemplo

$\circ$ fam rectas que pasan por $(0,1) \Rightarrow y = mx + 1$

- Evaluar punto cerca de recta $f(x, mx+1) = \frac{x^2 (mx+1-1)}{x^2 + (mx+1-1)^2} = \frac{x^2 m x}{x^2 + m^2 x^2} = \frac{x^2 x m}{x^2 (x^2 + m^2)}$

- Evaluar límite en punto de recta cerca del punto $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 x m}{x^2 (x^2 + m^2)} = 0 \Rightarrow$ si acerco con rectas el $\lim$ existe y es 0

$\circ$ fam parábolas que pasan por $y = mx^2 + 1$

- Evaluar func en parábola $f(x, mx^2+1) = \frac{x^2 (mx^2+1-1)}{x^2 + (mx^2+1-1)^2} = \frac{x^2 m x^2}{x^2 + m^2 x^4}$

- Ver límite en punto de parábola cerca del punto $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, mx^2+1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 m x^2}{x^2 + m^2 x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m}{1 + m^2}$ CONST $\in \mathbb{R}$ pero $m \geq 0$ y $m < 0$?

Ambas parábolas dan un límite distinto $\left\{ \begin{array}{l} f(x, x^2+1) = \frac{1}{2} \\ f(x, -x^2+1) = -\frac{1}{2} \end{array} \right.$ dan $\lim$ distintos $\neq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} f(x,y)$

Si el límite existe es único

* FUNCIONES ACOTADAS $\Rightarrow$ sirve para calcular límites de forma $0 \times$ acotado

(En gen) Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ decimos que f es acotada si $\exists M \in \mathbb{R} \wedge M > 0$

tal que $\|f(x)\| \leq M \quad \forall x \in D$

y sea $S \subset D$ decimos que f es acotada en S si existe $M > 0$ tal que $\|f(x)\| \leq M \quad \forall x \in S$

• Ejemplo $f(x, y) = \frac{x^2}{x^2 + y^2} \Rightarrow$ acotada en toda bola reducida en $(0, 0)$

$$x^2 \leq x^2 \Rightarrow x^2 \leq x^2 + y^2 \geq 0 \wedge (x, y) \neq (0, 0) \Rightarrow \frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1 \Rightarrow \left| \frac{x^2}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{1}{M}$$

por lo tanto f es acotada $B^*(r, (0, 0))$

$\Rightarrow$ En general si m y p son pares, $f(x, y) = \frac{x^m}{x^m + y^p}$, $g(x, y) = \frac{y^p}{x^m + y^p}$ son f acotadas en toda bola abierta red con $c \neq (0, 0)$

• Ej. $\lim_{x \rightarrow (0,0)} \frac{x^4}{x^2 + y^6} = \lim_{x, y \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 \cdot x^2}{x^2 + y^6} = 0$ $\exists \lim_{x, y \rightarrow (0,0)} \frac{x^4}{x^2 + y^6} = 0$

* Límite de campos vectoriales $\rightarrow$ se hace misma forma

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, e^{x+y} \right) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_1, \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_2 \right) = (0, 1)$$

• $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_2(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^{x+y} = 1$

demo acotado $x^2 \leq x^2 + y^2 \Rightarrow \frac{|x|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq 1 \Rightarrow \left| \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq 1$

• $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_1(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \cdot y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right) \cdot y = 0$

* Continuidad de campos (escalar y vectorial)

Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con D abierto y $A \in D$ punto de acumulación.

decimos que f continua en A si $\exists \lim_{x \rightarrow A} f(x) = f(A)$

f es continua en $S \subset D$ si es continua en todos los puntos de S

$\Rightarrow$ Ejemplo ① $f(x, y, z) = x^2 - yz \rightarrow$ continua porque es polinomio

② $f(x, y) = \begin{cases} 1 & y \geq 0 \\ -1 & y < 0 \end{cases}$

no es continua

* Derivada de Campos

• Derivadas de campos escalares

Sea $f = D \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Sea $A \in D$ y $\vec{r} \in \mathbb{R}^n$,

La derivada de f en A según $\vec{r}$ se define como $f'(A, \vec{r}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(A + h\vec{r}) - f(A)}{h}$

• (Caso versor $\vec{r}$)

Si $\|\vec{r}\| = 1$ el lim anterior nos da la derivada direccional $f(A, \vec{r}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(A, \vec{r}) - f(A)}{h}$

• (Caso canónico $\vec{r} = \vec{e}_k$) $\vec{e}_k = (0 \dots 1 \dots 0)$

→ en particular si se usa vector canónico, se lo llama derivada parcial de f en A respecto de x_k

$$f'(A, \vec{e}_k) = \frac{df}{dx_k}(A)$$

• propiedades

→ Si existe la derivada de un campo f en A según vector $\vec{r}$,

entonces existe la derivada en A según $\lambda \vec{r}$ siendo $\lambda \in \mathbb{R}$ (escalar) y se cumple $f'(A, \lambda \vec{r}) = \lambda f'(A, \vec{r})$

→ Si $\vec{r} \neq \vec{0}$, $\vec{r} = \frac{\vec{r}}{\|\vec{r}\|} \Rightarrow \vec{r} = \|\vec{r}\| \vec{r} \Rightarrow f'(A, \vec{r}) = \|\vec{r}\| f'(A, \vec{r})$

* Interpretación Geométrica de Derivada Parcial

$$\frac{df}{dx}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + y_0 + (h, 0)) - f(x_0, y_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

$$\frac{df}{dy}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + h) - f(x_0, y_0)}{h}$$

plano $x=1$ curva = [plano n superficie]

Derivada parcial → pendiente de la recta tg al punto de la curva formada por la intersección del plano y la superficie (gráfico) *

* Ejemplos prácticos

$$f(x, y, z) = xy + z^2$$

→ cuando derivas respecto a una var. olojo las otras dos variables constantes

$$\frac{d}{dx} f(x, y, z) = y \quad \frac{d}{dy} f(x, y, z) = x \quad \frac{d}{dz} f(x, y, z) = 2z$$

7/4

• Ejemplo Derivada direccional

① $f(x,y) = 2 - y^2 \rightarrow$ hallar derivada direccional f en $(1,-1)$ en direcc $\vec{r} = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$

$\Rightarrow A + h\vec{r} = (1 + \frac{h\sqrt{2}}{2}, -1 + \frac{h\sqrt{2}}{2})$

$\Rightarrow f(A + h\vec{r}) = 2 - (-1 + \frac{h\sqrt{2}}{2})^2 = (1 + h\sqrt{2} - \frac{h^2}{2})$

$\Rightarrow \frac{df}{d\vec{r}}(1,-1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(A+h\vec{r}) - f(A)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h\sqrt{2} - \frac{h^2}{2h}}{h} = \sqrt{2} = \frac{df}{d\vec{r}}(1,-1)$

② $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$ "Analizar derivada direccional de f en $A = (0,0)$ en toda direccin" $\rightarrow$ considerar vector gen $\vec{r} = (a,b)$

$\Rightarrow A + h\vec{r} = (ha, hb), \neq (0,0)$

$\Rightarrow f(A + h\vec{r}) = \frac{(ha)^2 hb}{(ha)^2 + (hb)^2} = \frac{ha^2 b}{h^2 a^2 + b^2}$

$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ha^2 b}{h^2 a^2 + b^2} \cdot \frac{1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^2 b}{h^2 a^2 + b^2} = \begin{cases} \frac{a^2}{b} & \text{si } a \cdot b \neq 0 \nearrow a \neq 0 \wedge b \neq 0 \\ 0 & \text{si } a \cdot b = 0 \rightarrow a = 0 \vee b = 0 \end{cases}$

• "Para funciones de una variable, f derivable en A quiere decir f continua en A "

$\Downarrow$
Esto no se aplica para campos escalares y vectoriales

$\hookrightarrow$ Un campo puede no ser continuo pero derivable en un punto

$\Downarrow$
ejemplo función anterior $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$

* Derivadas sucesivas

El Dominio de la función derivada es un subconjunto del Dominio de la función original $[Dg' \subseteq Dg]$

$\hookrightarrow$ ej: $g(x) = \ln(x) \rightarrow Dg = (0, \infty)$

$f'(x) = \frac{1}{x} \rightarrow Dg' = (0, \infty)$

En grad una función de n variables tiene, si existen,

* Derivadas parciales sucesivas

n^k derivadas parciales de orden k

¿Cuál es orden?

$\downarrow$
la cantidad de veces que se derivó de la función original

* TEOREMA DE SCHWARTZ $\Rightarrow$ Verifica igualdad de derivadas parciales independientemente de orden de derivación

Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ y $A \in D$

($k=1$) $\rightarrow \frac{df}{dx}$ y $\frac{df}{dy}$ existen en $B(A, r)$ no en punto sino en Bola abierta $\uparrow$ puntos cercanos a A del Dom D

($k=2$) $\rightarrow \frac{d^2f}{dy dx}$ existe en $B(A, r)$ y continua en $A \rightarrow$ continua en un entorno Δ

entonces $\exists \frac{d^2f}{dx dy}$ y se cumple $\frac{d^2f}{dx dy}(A) = \frac{d^2f}{dy dx}(A)$

$\rightarrow$ Son condiciones suficientes, pero no necesarias $\rightarrow$ puede no cumplir cond y que derivada en punto sea igual

$\rightarrow$ El teorema puede resultar poco práctica para ciertos funciones

$\rightarrow$ es válido para funciones de multivariables

$\rightarrow$ En Resumen = las derivadas parciales sucesivas "mixtas" coinciden cuando:

$\rightarrow$ las derivadas primeras existan en un entorno de punto a derivar $\frac{df}{dx}$ y $\frac{df}{dy}$

$\rightarrow$ Las derivadas segundas mixtas deben existir en un entorno de punto a derivar A $\frac{d^2f}{dy dx}$ y $\frac{d^2f}{dx dy}$

$\rightarrow$ Al menos una derivada mixta debe ser continua en entorno de ese punto A

$\downarrow$
 * Ejemplos =
 Que exista derivada $\rightarrow \exists$ coc incremental
 Que no sea continua $\rightarrow$ derivada por partes

o Derivada parcial no existe $f(x, y) = |x| + y \quad \begin{cases} x+y & \text{si } x \geq 0 \\ -x+y & \text{si } x < 0 \end{cases}$

$\rightarrow \frac{df}{dx}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1 \end{cases}$

$\neq \frac{df}{dx}(0, 0)$, entonces $\neq \frac{d^2f}{dy dx}$

o Derivada parcial no continua (pero existe) $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

$\rightarrow$ derivada parcial en $(0, 0)$

$\frac{df}{dx}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{h} = 0$

$\rightarrow$ derivada parcial en $(x, y) \neq (0, 0)$

$\frac{df}{dx}(x, y) = \frac{2xy(y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$

$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{2xy(y^2)}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{1}{2}$ $\rightarrow$ no coincide con $\frac{df}{dx}(0, 0)$
 $\downarrow$
 existe pero no es continua

- "Que exista derivada" $\rightarrow$ el cociente incremental tiene que ser finito y único

- "Que sea continua derivada parcial" $\rightarrow$ para $\exists \frac{df}{dx}(x, y)$ en $(a, b) =$

$\lim_{(x, y) \rightarrow (a, b)} \frac{df}{dx}(x, y) = \frac{df}{dx}(a, b)$

$\rightarrow$ Que exista lim en derivada $\rightarrow$ y que sea igual a derivada en ese punto

* Funciones de clase C^k

Sea $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, Dom abierta y $k \in \mathbb{N}$,

Decimos que f es de clase C^k en $D \rightarrow (f \in C^k(D))$ si existen todas las derivadas parciales de f hasta orden k inclusive y son continuas en D

• Resumen =

$\rightarrow$ Todas sus derivadas parciales (de orden 1 a orden k) existen

$\rightarrow$ Todas las derivadas parciales (de ord 1 a ord k) son continuas

• Ej: $\rightarrow C^0 = f$ es continua (no necesariamente derivable)

$\rightarrow C^1 = f$ es continua y sus derivadas parciales de primer orden son continuas

$\rightarrow C^2 = f$ es continua y sus derivadas parciales de 1^{er} y 2^{do} orden existen y son continuas

$\rightarrow C^\infty =$ todas sus derivadas de cualquier orden existen y son continuas $\rightarrow (e^x, \sin(x))$

• OBS

- si $f \in C^{k+1}(D) \rightarrow f \in C^k(D)$

- si $f \in C^2$ en $B(A, r) \rightarrow$ entonces cumple con teorema de Schwartz

- si $f \in C^k(B(A, r))$ los valores de las derivadas sucesivas de f en A hasta orden k

inclusive no va a impactar el orden de derivación, sino de la cantidad de veces que se deriva.
 $\downarrow$
der C^k no importa orden, sino cant de veces $\rightarrow$ ya que cumple con Schwartz deriv. resp de c/ var

* Derivadas campos vectoriales

$\downarrow$

Un campo vectorial es un campo escalar en cada uno de sus coord

Su derivada devuelve un vector

$$\text{Ej } f(x, y) = (f_1, f_2, f_3) \quad \frac{df}{dx}(x, y) = \left(\frac{df_1}{dx}, \frac{df_2}{dx}, \frac{df_3}{dx} \right) \quad \frac{df}{dy}(x, y) = \left(\frac{df_1}{dy}, \frac{df_2}{dy}, \frac{df_3}{dy} \right)$$

f es derivable en A s6lo si existen todas las derivadas parciales de las funciones coordenadas

CONCEPTO DIFERENCIABILIDAD

• Diferenciabilidad en $\mathbb{R}$

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

↕ reescritura

$$f(x_0+h) - f(x_0) = f'(x_0)h + E(h), \text{ donde } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{E(h)}{h} = 0$$

$E(h)$ tiende más rápido que h que tiende a 0

→ ¿Continuidad de derivadas en una curva? ⇒ Que la función sea "suave" en ese punto

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f'(x) (= f'(a))$$

• Diferenciabilidad en $\mathbb{R}^2$ campos

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0)}{h}$$

↪ en el método práctico mantenemos como constante la otra var, similar a cuando graficamos y hacemos "cortes con planos"

↪ permite relacionar 2 variables y no 3 al mismo tiempo

• reescritura $h = \Delta x = x - x_0$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \Delta x + \underbrace{E(\Delta x)}_{\rightarrow 0}$$

$$f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \Delta y + \underbrace{E(\Delta y)}_{\rightarrow 0}$$

→ Si es dif, entonces $\frac{E(\Delta x)}{\Delta x}$ y $\frac{E(\Delta y)}{\Delta y}$ tienden a 0

¿Y si tiendo a $\Delta x \rightarrow 0$ y $\Delta y \rightarrow 0$ al mismo tiempo? → sumando las dos ecuaciones parciales

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \left[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \Delta y + \frac{E(\Delta x)}{\Delta x} \Delta x + \frac{E(\Delta y)}{\Delta y} \Delta y \right]$$

$L(x, y)$ las derivadas parciales

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \left[f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) - \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \Delta y \right) \right] = \frac{E(\Delta x)}{\Delta x} \Delta x + \frac{E(\Delta y)}{\Delta y} \Delta y = \frac{E(\Delta x, \Delta y)}{\|(\Delta x, \Delta y)\|}$$

* DEFINICIÓN DIFERENCIABILIDAD

Sea $f = D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $A \in D$ ^{point int}.

Se dice que f es diferenciable en A si:

$$\lim_{H \rightarrow 0} \frac{f(A+H) - f(A) - TL(H)}{\|H\|} = 0$$

con $TL(H)$ transf Lineal

Los campos son TL ya que se pueden expresar con matriz escurada

$$f(x,y) = f(-x+2y, x-2y) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

→ donde la matriz de TL son las derivadas parciales en ese punto

• Ejemplos

Caso $\mathbb{R}^2$. Sea $f = D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $A = (x_0, y_0) \in D^0$ $H = (h, k)$.

f es diferenciable si $\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0) - (\alpha h + \beta k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$

$$\begin{cases} \alpha = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) \\ \beta = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) \end{cases}$$

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x_0+h, y_0+k) - (f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)h + f'_y(x_0, y_0)k)}{\sqrt{h^2+k^2}} = 0$$

⇒ ¿Y si reemplazo $h = x - x_0$ y $k = y - y_0$? (INTERPRET. GEOM)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f(x, y) - (f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x-x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y-y_0))}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0$$

⇒ $z = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x-x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y-y_0)$ ↗ Ecuación plano

* TEOREMAS DIFERENCIABILIDAD

(T1) Una func vectorial dif en A si y sólo si todas sus funciones coord son dif en A

(T2) f diferenciable en A → f continua en A

(T3) f diferenciable en A → f derivable en A

(T4) Sea $f = D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $n > 1$ y $A \in D^0$ si: $f \in C^1(E(A))$ entonces f dif en A

* Plano tangente

$$z = f(x_0, y_0) + f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

→ el plano tangente permite una aproximación lineal al punto

↳ calc ecuación plano → reemplazar pts en plano

* GRADIENTE (sólo para campo escalar)

Sea f un campo escalar derivable en un punto A

El gradiente de f es el vector $\nabla f(A) = \left(\frac{\partial f(A)}{\partial x}, \dots, \frac{\partial f(A)}{\partial n} \right)$

Cuyos componentes son los derivados parciales

* MATRIZ JACOBIANA

Matriz asociada a la TL de diferenciabilidad

Cuando $f = D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($f = (f_1, \dots, f_m)$) es dif en A la TL que existe tiene una matr. z

asociada llamada matriz jacobiana de f en A

$$D_f(A) = \begin{bmatrix} \nabla f_1(A) \\ \nabla f_2(A) \\ \vdots \\ \nabla f_n(A) \end{bmatrix}$$

122/4

* Aproximación Lineal

Sea $f = D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $n > 1$ y diferenciable AED.

Entonces $f(x) \cong f(A) + \nabla f(A)(x-A) \quad \forall x \in E(A) \subset D$

$f(x,y) \cong L(x,y)$ → en un entorno cerca de (x_0, y_0) donde se definió

* Conjunto conexo

→ Si se puede describir como $A \cup B$, con $A \cap B = \emptyset$ → como dos conjuntos sin intersección

Sea $S \subseteq \mathbb{R}^n$ Decimos que S es conexo si no se puede describir como unión disjunta

de otros dos conjuntos no vacíos

$A \rightarrow$ conexo
 $B \rightarrow$ no-conexo

Teoremas ① Si S es arco-conexo → S es conexo

② Si S es abierto y conexo → S es arcoconexo

③ La imagen de un conjunto conexo, a través de una función cont. a. a., es un conj. conexo

SUPERFICIES

Llamamos superficie a la imagen de un campo vectorial continua $\bar{F} = D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

tener en cuenta que las parametrizaciones no son $(x, y, z) \rightarrow$ puntos del espacio

• Para la notación $\text{sup. } S$ o Σ (sigma)

Si X es un pts genérico en $\mathbb{R}^3$ $X = \bar{F}(u, v)$, $(u, v) \in D$ es una ec. parametr. de la superficie

$\bar{F}$ es la parametrización con (u, v) de parámetros

• Como D es cony, conexo (Dom natural) y $\bar{F}$ es continua entonces sup. es un cony, conexo

* Lineas coordenadas $\rightarrow$ si mantengo fija un parámetro, entonces obtengo una curva en la superficie

Las líneas coordenadas son aquellas líneas incluidas en la superficie que se obtienen dejando uno de los parámetros fijo y variando el otro.

Si $u = u_0$; $X = F(u_0, v)$, $(u_0, v) \in D$

$\rightarrow C_{v=v_0} = F(u, v_0)$
Si $v = v_0$; $X = F(u, v_0)$, $(u, v_0) \in D$

* Puntos regulares y simples

Sea Σ la sup de ecuación $X = F(u, v)$, $(u, v) \in D$ y $A = F(u_0, v_0)$, $(u_0, v_0) \in D$

• A es un punto regular de $\Sigma \rightarrow \bar{F}$ diferenciable en (u_0, v_0) y $\underbrace{\frac{\partial F}{\partial u}(u_0, v_0) \times \frac{\partial F}{\partial v}(u_0, v_0)}_{\text{prod vectorial fundamental}} \neq \vec{0}$

existencia de vector normal

• A es punto simple de Σ si es imagen, a través de $\bar{F}$ de un único punto en $D \rightarrow$ inyectividad

• Σ sup reg si todos sus puntos son regulares

• Σ sup simple si todos sus puntos son simples

* Plano tangente y recta normal a una superficie

si $A = \bar{F}(u_0, v_0)$, $(u_0, v_0) \in D$ un pto regular y simple

$\vec{N} = \frac{\partial F}{\partial u}(u_0, v_0) \times \frac{\partial F}{\partial v}(u_0, v_0) \quad \rightarrow \text{OJO que las derivadas parciales no sean LD}$

linealmente dependientes

$\rightarrow$ recta normal a Σ en A

$\rightarrow$ plano t_z

$X = A + \lambda \vec{N}$, $\lambda \in \mathbb{R}$

$\vec{N} \cdot (X - A) = 0$

↳ Ejemplo $f = D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, D conexo y f continuo en D

$$\text{gr} f \text{ sup de ec } X = \underbrace{(x, y, f(x, y))}_{F(x, y)}, (x, y) \in D$$

$F = D \rightarrow \mathbb{R}^3$

Si f diferenciable en $D \rightarrow$ entonces sus puntos son reg y simples

$\bar{F}$ dif porque sus funciones coord son diferenciables

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) \times \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \\ 0 & 1 & \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \end{vmatrix} = \underbrace{\left(-\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), -\frac{\partial f}{\partial y}(x, y), 1 \right)}_{\vec{N}_0} \neq 0$$

$$A = \bar{F}(x_0, y_0) = (x_0, y_0, f(x_0, y_0))$$

$$\rightarrow \underline{\text{plano}} = \vec{N}_0 \cdot (X - A)$$

$$\left(-\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), -\frac{\partial f}{\partial y}(x, y), 1 \right) \cdot \left[(x, y, z) - (x_0, y_0, f(x_0, y_0)) \right]$$

$$\left(-\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), -\frac{\partial f}{\partial y}(x, y), 1 \right) \cdot (x - x_0, y - y_0, z - f(x_0, y_0))$$

$$z = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + f(x_0, y_0)}_{\text{Ecuación plano tangencial a sup en A}}$$

Ecuación plano tangencial a sup en A.